



ЖУСС АРГЕНТУМ ДУО



5л - 960р (за 1л с НДС)
1л - 1150р (за 1л с НДС)

Препарат проникает через клеточную стенку патогена и затем уже вступает во взаимодействие с внутриклеточным содержимым. Механизм поступления действующего вещества в клетку растения представляет собой диффузию средства через клеточную оболочку и мембрану, по градиенту концентрации, тем самым повышая питательный режим и иммунитет растения.

Органические Серебро и Медь в ионной форме - обладает лечебно-профилактическим бактерицидным действием, а также фунгистопным действием против возбудителей настоящей и ложномучнистой росы (в т.ч. милдью и оидиум), ржавчины, монилиозов, коккомикоза, класстероспориоза и др. пятнистостей листьев, возбудителей серой и др. гнилей, трахеомикозов, фузариозного, вертициллёзного вилта и др. видов увядания, видов парши, альтернариоза, кладоспориума, глеоспор

Ионная медь выполняет роль Иммуностимулятора, повышает интенсивность дыхания, фотосинтеза, регулирует углеводный и белковый обмен. Повышает засухо -, морозо -, и жароустойчивость. Также ионы меди являются катализатором и синергистом ионов серебра при бактерицидном действии: при взаимодействии ионов этих металлов с белком образуются альбуминаты, что приводит к денатурации белка микроорганизмов.

ЖУСС АРГЕНТУМ ДУО

Преимущества

- Малые нормы внесения облегчают транспортную логистику и физический труд
- Активность даже при предельно низких температурах
- Не вызывает привыкания, что позволяет проводить обработки, в экстремальных погодных условиях, до получения нужного результата
- Способствует образованию хлорофилла и повышает интенсивность дыхания растений
- Уничтожение возбудителей гнилей в период вегетации овощных и плодово-ягодных культур
- Возможность обработки культурных растений, в максимальных концентрациях, перед сбором урожая овощных и плодово-ягодных культур, за счет отсутствия токсичности для пчел и человека (при соблюдении рекомендованных норм внесения)
- Увеличение урожайности, лёжкости и выхода овощной и плодово-ягодной товарной продукции (предотвращает гниение и появление плесени).
- Полное растворение в воде
- Неиспользуемый рабочий раствор может храниться длительное время
- Применяется для обработки семян и посадочного материала
- Обработки проводят в критические периоды роста и развития культурных растений.
- ЖУСС марки Аргентум Дуо относится к 4 классу опасности (мало опасное вещество)

ЖУСС АРГЕНТУМ ДУО

Норма применения препарата л/га, л/т	Культура, обрабатываемый объект	Вредный объект	Способ, время обработки, особенности применения	Срок ожидания, кратность обработки	Сроки выхода для ручных и мех. работ
0,7-0,8	Яблоня, груша, айва, рябина, цитрусовые, фейхоа, киви, гранат и др. субтропические культуры.	Мучнистая роса, монилиоз, парша (на плодах профилактически), филлостикта, клadosпориум, альтернария, бактериозы (в т.ч. эрвиния) вертициллёз, возбудители плесневения плодов (фузариум, пеницилл и др.)	До и после цветения далее, при росте и созревании плодов, с интервалом 2-3 недели. На раннеспелых, иммунных сортах - 4, на зимних и позднеспелых, а так же восприимчивых до 6	1 (4-6)	1/1
0,7-0,8	Виноград	Милдью, оидиум, бактериозы, антракноз, серая гниль, возбудители плесневения ягод (фузариум, пеницилл, клadosпориум, альтернария, пеницилл и др.)		1 (4-6)	1/1
0,7-0,8	Вишня, черешня, алыча, слива, абрикос, персик, малина, клубника, земляника смородина, крыжовник ежевика, и др. косточковые и ягодные культуры.	Коккомикоз, монилиоз, кластероспориоз, ржавчина, возбудители плесневения ягод, (фузариум, серая гниль, виды пятнистостей листьев и ржавчин (профилактика), антракноз, мучнистая роса, вертициллёз клadosпориум, пеницилл, альтернария, виды парши (профилактика), курчавость листьев, септориоз (профилактика) пеницилл и др.)	До и после цветения, далее при росте и созревании плодов с интервалом 2-3 недели. На раннеспелых сортах - 3, позднеспелых - 6	1 (3-6)	1/1
0,7-0,8	Туя, можжевельник, ель сосна, кедр, и др. хвойные породы, каштан, розмарин и др. Широкколистные породы.	Бактериозы, виды пятнистостей, фузариозы, вертициллёз, монилиоз, мучнистая роса, пеницилл, кластероспориоз.	С интервалом 2-3 недели. При изменении окраски, появлении пятен и некроза на листьях. При увядании и усыхании растений	1 (2-4)	1/1
1,2	Саженьцы плодовых, орехоплодных и древесно-кустарниковых культур, винограда (10 мл на 1л воды).	Бактериозы, фузариозы, вертициллёз, монилиоз, пеницилл.	Обработка посадочного материала. Профилактика болезней, улучшение приживаемости.	1 (1)	1/1
0,5-0,75	Огурцы, томаты, баклажаны, перец (в т.ч. тепличные), картофель.	Настоящая и ложная мучнистая роса, фитофтороз, альтернариоз, бактериоз, фузариоз, вертициллёз, антракноз, виды парши, ризоктониоз, белая и серая гниль.	Фазы: 2-8 пар листьев, бутанизации, до и после цветения, далее с интервалом 10-14 дней, за 1-3 дня до съёма урожая	1 (4-6)	1/1
0,5-0,75	Морковь, кабачки, бакчи, редька, лук, чеснок, фасоль, топинамбур, репа, виды капусты и др. овощные культуры	Настоящая и ложная мучнистая роса, альтернариоз, бактериоз, антракноз, аскохитоз, фузариоз, белая и серая гниль, кила, др. возбудители гниения и плесневения, чёрная ножка.		1 (2-4)	1/1
0,5-0,75	Газонные травы, зеленные, пряные цветочно-декоративные лекарственные культуры, в т.ч. тепличные, комнатные.	Настоящая и ложная мучнистая роса, вертициллёз, альтернариоз, бактериоз, фузариоз, белая и серая гниль др. возбудители гниения и плесневения.	По вегетации с интервалом 1,5-3 недели. При изменении окраски, появлении пятен и некроза на листьях. При увядании и усыхании растений	1 (2-5)	1/1
0,5-0,75	Рассада, клубни, луковичы, корнеплоды, семена (10 мл/1л воды)	Фитофтороз, вертициллёз, альтернариоз, бактериоз, фузариоз, белая и серая гниль др. возбудители гниения и плесневения.	Обработка посадочного материала. Профилактика болезней, улучшение приживаемости.	1 (1)	1/1
0,5-0,75	Эфиромасличные культуры, в т.ч. лаванда, кориандр, тимьян, роза	Альтернариоз, бактериоз, мучнистая роса, корневые гнили, белая гниль (профилактика), плесневение семян, фузариоз, рамуляриоз.	Опрыскивание посевов -4-8 пар листьев, бутанизации, налив зерна,	1 (1-2)	1/1
0,2-0,3		Альтернариоз, бактериоз, корневые гнили, белая гниль (профилактика), плесневение семян, фузариоз.	Предпосевное протравливание семян. Расход рабочей жидкости 10л/т	1	1/1
0,5-0,6	Подсолнечник, кунжут, рыжик и др. масличные культуры	ЛМР, альтернариоз, бактериозы, септориоз (профилактика), фузариоз, эмбилизия, ризопус, серая, пепельная и белая гниль (профилактика), ржавчина (профилактика)	Опрыскивание посевов -4-8 пар листьев, бутанизации, цветения, налив зерна, при десикации.	1 (1-3)	1/1
0,5-0,6 (А)		Плесневение семян, ризопус, серая, белая гниль (без склеротий), альтернариоз, бактериозы, .	Предпосевное протравливание семян. Расход рабочей жидкости 10л/т	1	1/1
0,2					
0,5-0,6	Рис	Пирикулярриоз (профилактика), корневые гнили, фузариоз, бактериоз.	Опрыскивание посевов 3-5 листьев, кущение- начало выхода в трубку, колошение, налив зерна	1 (1-3)	1/1
0,5-0,6 (А)		Пленение семян, корневые гнили, фузариоз, бактериоз.	Предпосевное протравливание семян. Расход рабочей жидкости 10л/т	1	1/1
0,2					

ЖУСС АРГЕНТУМ ДУО

0,5-0,6	Зерновые колосовые (рожь, ячмень, пшеница), овёс, просо, сорго, кукуруза, гречиха	Корневые, прикорневые гнили, ризоктониоз, бактериоз, альтернариоз, чёрный зародыш, септориоз (профилактика), фузариоз, виды ржавчины (профилактика), гельминтоспориоз, мучнистая роса, снежная плесень, пиренофороз, ринхоспореллёз (профилактика), красно бурая пятнистость, тифулёз	Опрыскивание посевов 3-5 листьев, кущение- начало выхода в трубку, колошение, налив зерна,	1 (1-3)	1/1
0,3-0,4		Корневые, прикорневые гнили, ризоктониоз, бактериоз, альтернариоз, чёрный зародыш, фузариоз, гельминтоспориоз, снежная плесень, плесневение семян, красно бурая пятнистость.	Предпосевное протравливание семян. Расход рабочей жидкости 10л/т	1	1/1
0,5-0,6	Зерно-бобовые, в т.ч. соя, нут, горох, чичевица	Корневые гнили, фузариоз, бактериоз, аскохитоз, настоящая и ложная мучнистая роса, плесневение зерна, серая, белая гниль (профилактика)	Опрыскивание посевов -4-8 пар листьев, бутанизации, налив зерна, при десикации,	1 (1-3)	1/1
0,5-0,6 (А)					
0,3-0,4		Корневые гнили, фузариоз, бактериоз, аскохитоз, плесневение семян, серая, белая гниль (профилактика).	Предпосевное протравливание семян. Расход рабочей жидкости 10л/т	1	1/1
0,5-0,6	Рапс, горчица	ЛМР, альтернариоз, бактериоз, корневые гнили, плесневение семян, белая гниль (профилактика),	Опрыскивание посевов -4-8 пар листьев, бутанизации, цветения, налив зерна, при десикации,	1 (1-3)	1/1
0,5-0,6 (А)					
0,3-0,4		Альтернариоз, бактериоз, корневые гнили, белая гниль (профилактика), плесневение семян, фузариоз.	Предпосевное протравливание семян. Расход рабочей жидкости 10л/т	1	1/1
0,5-0,6	Лён	Антракноз, крапчатость, фузариоз, бактериозы, корневые гнили	Опрыскивание посевов -4-8 пар листьев, бутанизации, налив зерна,	1 (1-2)	1/1
0,2		Антракноз, крапчатость, корневые гнили, плесневение семян, фузариоз, бактериозы.	Предпосевное протравливание семян. Расход рабочей жидкости 10л/т	1	1/1
0,5-0,6	Свекла Сахарная, столовая, кормовая в т.ч. семенники	Мучнистая роса, бактериозы, корневые гнили, плесневение и гнили корнеплодов (в т.ч. при хранении), церкоспороз (профилактика), фомоз (профилактика), фузариоз, плесневение соплодий.	Опрыскивание посевов фазы вилочки, 2-8 пар листьев, смыкание листьев в рядах и междурядьях, рост корнеплода.	1 (1-3)	1/1